

### Eigenschappen

- doordachte mengeling van meer dan 50 verschillende soorten weidebloemen
- voor een onderhoudsarm en natuurlijke bloemenweide
- zowel éénjarige als meerjarige bloeiende planten, voor een kleurenpalet aan bloemen, hoog en laag, van de lente tot de late herfst
- zaden met hoge kiemkracht en zuiverheid
- geschikt voor alle grondsoorten, bij voorkeur schrale gronden
- uitermate gebruikt om bermen in te zaaien
- kan gebruikt worden om kale plekken in een bestaande bloemenweide door te zaaien



### Samenstelling

<i>Achillea millefolium</i>	Duizendblad	<i>Lavatera trimestris</i>	Bekermalva
<i>Adonis aestivalis</i>	Zomeradonis	<i>Limnanthes douglasii</i>	Moerasbloem
<i>Agrostemma githago</i>	Bolderik	<i>Linaria maroccana</i>	Vlasleuwebekje
<i>Alyssum maritimum</i>	Schildzaad	<i>Linum Rubrum Grandiflorum</i>	Rode vlas
<i>Anethum graveolens</i>	Dille	<i>Linum usitatissimum</i>	Vlas
<i>Anthemis tinctoria</i>	Gele kamille	<i>Lupinus angustifolius</i>	Blauwe lupine
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Akelei	<i>Lupinus hartwegii</i>	Lupine eenjarig
<i>Calendula officinalis</i>	Goudsbloem	<i>Lupinus luteus</i>	Gele lupine
<i>Centaurea cyanus</i>	Korenbloem	<i>Lupinus perennis</i>	Wilde lupine
<i>Cheiranthus cheirii</i>	Muurbloem	<i>Malope trifida grandiflora</i>	Trechtermalva
<i>Cheiranthus maritimus</i>	Strandviooler	<i>Malva moschata</i>	Muskuskaasjeskruid
<i>Chichorium intybus</i>	Chicorei	<i>Malva sylvestris</i>	Groot kaasjeskruid
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	Gewone margriet	<i>Matricaria chamomilla</i>	Kamille
<i>Chrysanthemum segetum</i>	Gele ganzebloem	<i>Myosotis alpestris</i>	Alpen vegeet-mij-nietje
<i>Coreopsis lanceolata</i>	Hoge meisjesogen	<i>Nigella damascena</i>	Juffertje-in-'t-groen
<i>Coreopsis tinctoria</i>	Meisjesogen	<i>Nigella sativa</i>	Zwarte komijn
<i>Coriandrum sativum</i>	Koriander	<i>Oenothera lamarckiana</i>	Grote teunisbloem
<i>Cynoglossum amabile</i>	Chinees vergeet-mij-nietje	<i>Papaver glaucum</i>	Tulppapaver
<i>Daucus carota</i>	Wilde peen	<i>Papaver rhoeas</i>	Klaproos
<i>Delphinium</i>	Ridderspoor	<i>Plantago lanceolata</i>	Smalle weegbree
<i>Delphinium consolida</i>	Wilde ridderspoor	<i>Prunella vulgaris</i>	Gewone brunel
<i>Dianthus barbatus</i>	Duizendschoon	<i>Reseda odorata</i>	Reseda
<i>Digitalis purpurea</i>	Vingerhoedskruid	<i>Rumex sanguineus</i>	Rode zuring
<i>Dipsacus sativus</i>	Weverskaarde	<i>Saponaria officinalis</i>	Zeepekruide
<i>Echium plantagineum</i>	Slangekruid	<i>Saponaria vaccaria</i>	Koekruid
<i>Eschscholzia californica</i>	Slaapmutsje	<i>Silene latifolia</i>	Avondskoekoekoekskruid
<i>Gilia leptantha</i>	Vogeloogjes	<i>Silene vulgaris</i>	Blaassilene
<i>Gypsophila elegans</i>	Gipskruid	<i>Verbena tenuisecta</i>	Mosverbena
<i>Hesperis matronalis</i>	Damastbloem	<i>Viola tricolor</i>	Driekleurig viooltje
<i>Iberis sempervirens</i>	Witte scheefbloem	<i>Viscaria oculata</i>	Hemelroosje
<i>Lavandula angustifolia rosea</i>	Lavendel		

DCM n.v. behoudt het recht, om in functie van beschikbaarheid, de samenstelling van het mengsel aan te passen met gelijkwaardige ras.

### Verpakking

waterbestendig en hersluitbaar zakje van 500 g; goed voor 500 m<sup>2</sup>



# DCM WILDE BLOEMEN MIX

## Weidebloemenmengsel

### Gebruiksaanwijzing

**Ideale periode voor aanleg bloemweide:** maart – april – mei

Zaai bij voorkeur in het voorjaar om nog hetzelfde jaar bloemen te hebben.

Indien u in het najaar zaait zullen de éénjarigen wel groeien, maar niet bloeien.

### Vorbereiding

- kies een zonnige plaats uit in uw tuin voor de aanleg van uw bloemenweide
- verwijderen stenen, onkruiden, bestaande graszode
- spit 30 cm om en laat de grond liggen zodat hij kan zakken
- werk oneffenheden weg en egaliseer de bodem door te harken en te rollen

### Zaaien

- zaai bij windstil weer op een vochtige bodem
- dosis: 1 g/m<sup>2</sup>
- voor een optimale verdeling: meng de bloemenzaden vooraf met fijn zand en zaai de helft van de dosis in de lengterichting en de helft in de breedterichting
- hark de zaadjes licht in (tot maximaal 1,5 cm) en rol aan

### Nabehandeling

- houd, zeker in droge periodes, de toplaag voldoende vochtig tijdens de kieming

### Maaibeheer

Een bloemenweide vraagt niet veel onderhoud om er jaarrond van te kunnen genieten, wel is een aangepast maaibeheer aangewezen. Maai uw bloemenweide na de bloei en zaadvorming (september – oktober) met een zeis of bosmaaier op +/- 10 cm. Laat het maaisel enkele dagen liggen. Schud het hooi regelmatig op zodat de zaadjes voor het volgende jaar eruit vallen en opschietende planten niet verstikt worden. Wanneer er terug voldoende vegetatie aanwezig is, mag het hooi verwijderd worden.

Producten van DCM zijn conform de gegevens vermeld op de verpakking en/of technische fiche en zijn volledig traceerbaar. Productadviezen zijn enkel informatief en leiden niet tot een verbintenis of overeenkomst. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. Elke plant en elk teeltsysteem heeft zijn eigen behoefte. Ook het moment van de toepassing, bodem/substraattype en de wettelijke normen zijn van belang bij het bepalen van de dosis. Het is raadzaam (goede praktijk) nieuwe toepassingen telkens vooraf op kleine schaal te testen. DCM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade bij gebruik van zijn producten.